

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Produkts beachten sollten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

1. Was ist das Anwendungsgebiet von voice-angin?
2. Was ist in voice-angin enthalten?
3. Was müssen Sie vor der Einnahme von voice-angin beachten?
4. Wie ist voice-angin anzuwenden?
5. Was ist zu tun, wenn voice-angin in großen Mengen angewendet wurde?
6. Wie ist voice-angin aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?
7. Weitere Informationen

1. WAS IST DAS ANWENDUNGSGEBIET VON VOICE-ANGIN?

voice-angin Lutschtabletten werden bei Heiserkeit, Halskratzen und trockenem Rachenraum angewendet. voice-angin bildet einen Schutzfilm, welcher die Symptome einer Heiserkeit lindert und als körperlich-physikalische Barriere gegenüber Erregern wirkt.

Der Schutzfilm von voice-angin hilft beispielsweise bei:

- übermäßiger Beanspruchung der Stimme (z.B. Vorträge oder Gesang)
- trockener Luft (z.B. durch Heizung oder Klimaanlage)
- Reisen in klimatisierten Fahrzeugen (z.B. Auto, Bus, Bahn, Flugzeug)
- während der Erkältungszeit
- während der Allergiezeit zum Schutz vor Pollen (z.B. Heuschnupfen)
- bei starkem Rauchen

Der Schutzfilm von voice-angin schützt vor externen /exogenen Erregern.

2. WAS IST IN VOICE-ANGIN ENTHALTEN?

voice-angin Lutschtabletten enthalten: Carbopol, Polyhexanidhydrochlorid, Carrageen, Natriumhyaluronat, Mannitol, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Macrogol, Sucralose, Levomenthol, Kaliummonohydrogenphosphat, Zinkstearat, Siliciumdioxid, Sorbitol, Xanthan, Menthylsalicylat, Aromastoffe.

3. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VOICE-ANGIN BEACHTEN?

voice-angin darf nicht eingenommen werden

- bei Überempfindlichkeit gegen einen der enthaltenen Inhaltsstoffe

voice-angin enthält Mannitol, Sucralose und Sorbit. Wenn Sie unter Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Zuckern leiden, wenden Sie die voice-angin Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Wenn Sie an einer krankhaften Reduktion der Speichelsekretion leiden, fragen Sie vor dem Lutschen Ihren Arzt oder Apotheker.

Bitte voice-angin Lutschtabletten nicht im Liegen lutschen, z. B. beim Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung von voice-angin Lutschtabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher keine bekannt.

Darreichungsform und Inhalt:

20 Lutschtabletten

4. WIE IST VOICE-ANGIN ANZUWENDEN?

Verwenden Sie die voice-angin Lutschtabletten gemäß den Anwendungshinweisen in dieser Gebrauchsanweisung wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

Mehrmals täglich, bis zu 6 Tabletten pro Tag.

Kinder und Jugendliche von 6 -12 Jahren

Mehrmals täglich, bis zu 3 Tabletten pro Tag.

Wir empfehlen die Einnahme nach dem Essen und Trinken.

Bitte lutschen Sie voice-angin langsam bis die Lutschtablette vollständig aufgelöst ist, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Bitte schlucken Sie die Tabletten nicht im Ganzen hinunter und zerbeißen Sie diese nicht.

Regelmäßige und präventive Anwendung

Die regelmäßige und ordnungsgemäße Anwendung der voice-angin Lutschtabletten ist für die Wirkung von entscheidender Bedeutung. Lutschen Sie voice-angin präventiv, wenn Sie wissen, dass Ihre Stimme stark beansprucht wird, beispielsweise bei langen Vorträgen und beim Gesang.

Dauer der Anwendung

Bei Bedarf kann voice-angin über einen längeren Zeitraum (z.B. Allergiezeit oder Erkältungszeit) angewendet werden. Sollten akute Beschwerden länger als 2-3 Tage bestehen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

5. WAS IST ZU TUN, WENN VOICE-ANGIN IN GROßEN MENGEN ANGEWENDET WURDE?

Wenn Sie größere Mengen von voice-angin eingenommen haben als Sie sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

voice-angin enthalten Süßungsmittel, welche bei übermäßigem Verzehr abführend wirken können. Gegenmaßnahmen sind in diesem Fall nicht erforderlich

6. WIE IST VOICE-ANGIN AUFZUBEWAHREN UND WIE LANGE IST ES HALTBAR?

Das Haltbarkeitsdatum von voice-angin ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen die voice-angin Lutschtabletten nicht mehr angewendet werden.

Bitte verschließen Sie nach jeder Einnahme das Röhrchen wieder sorgfältig. voice-angin Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25°C zu lagern.

7. WEITERE INFORMATIONEN

Bitte bewahren Sie das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf!

Packungsgrößen

20 Lutschtabletten

Stand der Information

Oktober 2015



Apothekenexklusives Medizinprodukt



Hersteller:

MPC International S. A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Vertrieb:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH
Doerenkampgasse 11
1100 Wien



Nur einmal verwenden!



Packungsbeilage beachten!



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Obere Temperatur-
begrenzung 25 °C

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH:

Tel: +43 (0) 1 688 21 61 -0

Fax: +43 (0) 1 688 21 61 -27

E-Mail: office@klosterfrau.at

Internet: www.voice-angin.at

Eine starke Stimme und einen gesunden Hals wünscht Ihnen voice-angin!