

Packungsbeilage

easygastril Kautabletten 24 Stück
Medizinprodukt

Zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden im Zusammenhang mit gastroösophagealem (Sodbrennen, saures Aufstoßen) und laryngopharyngealem Rückfluss, bei Übersäuerung des Magens sowie zum Schutz der Magenschleimhaut.

1. Erscheinungsbild, Zusammensetzung und Wirkung

1.1 Wirkmechanismus

Die besonderen Haft-Eigenschaften an der Schleimhaut (Mucoadhäsivität) von **Tamarindensamen** können die Schleimhäute des Gastrointestinaltrakts vom Rachen (Pharynx) bis zum Magen schützen. Das Präparat haftet an der Schleimhaut, bildet dort eine Barriere zum sauren Mageninhalt und lindert dadurch die Symptome des Rückflusses aus dem Magen in die Speiseröhre oder den unteren Rachenraum (gastroösophagealer bzw. laryngoösophagealer Reflux).

Das **Alginat**, ein aus spezifischen Algen isoliertes Polysaccharid, führt beim Erreichen des Magens sehr schnell zur Bildung eines viskösen und leichten Gels, das die Magenschleimhaut bedeckt und schützt. Das visköse Alginatgel erschwert auch die Aufstiegsbewegungen des Mageninhalts, wodurch die Anzahl der Refluxepisoden wesentlich verringert wird.

Die **Carbonat- und Bicarbonat-Verbindung** neutralisiert die Magensäure. Darüber hinaus werden die bei der Reaktion entstehenden Kohlendioxidblasen durch das Alginat-Gel gebunden, wodurch ein Schaum entsteht, der auf der Oberfläche des Magensafts schwimmt. Im Falle von Reflux besteht der dann in die Speiseröhre eintretende Schaum hauptsächlich aus Alginat, das die Schleimhaut physikalisch vor Schäden durch den Kontakt mit Säuren und Verdauungsenzymen schützt. Der Schaum bleibt solange im Magen bestehen, bis die Magenverdauung beendet ist und er mit dem restlichen Mageninhalt in den Dünndarm transportiert wird.

Darüber hinaus unterstützen die muco-adhäsiven Eigenschaften von Tamarindensamen den Schutz der Magenschleimhaut.

1.2 Zusammensetzung

Jeder Kautablette enthält:

Natriumalginat, Kalziumcarbonat, Kaliumbicarbonat, Tamarindus indica Samenextrakt
Hilfsstoffe: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Maltodextrin, Magnesiumstearat, Minzaroma, Siliziumdioxid, Sucarlose.

2. Verpackung

Eine Packung enthält 24 Kautabletten.

3. Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene und Jugendliche (12-18 Jahre):

Die empfohlene Dosierung beträgt bis zu sechs Kautabletten pro Tag. Jeweils bis zu zwei Kautabletten sollen unmittelbar nach den beiden Hauptmahlzeiten und vor dem

Schlafengehen für mindestens zwei Wochen bis zum Abklingen der Beschwerden eingenommen werden. Sollten Ihre Beschwerden auch nach einmonatiger Anwendung noch anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Kinder (6-12 Jahre): Halbe Dosis.

4. Nebenwirkungen

Mit Ausnahme von individuellen Unverträglichkeiten wurde bei den zur Erreichung der therapeutischen Wirkung notwendigen Dosierungen keine Nebenwirkungen abgesehen von Verstopfung bzw. vorübergehender Übelkeit berichtet. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten

Aufgrund seiner viskosen Beschaffenheit kann **easygastril Kautabletten** die Wirkung anderer gleichzeitig eingenommener Arzneimittel beeinflussen (Verzögerungen oder Einschränkungen der Aufnahme Absorption).

Informieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit der Einnahme von **easygastril Kautabletten** beginnen, besonders wenn Sie Antibabypillen oder lebensrettende Medikamente verwenden.

Es gibt keine Gegenanzeigen für die Verwendung von **easygastril Kautabletten** gleichzeitig mit pharmakologisch wirksamen Produkten wie Omeprazol, Cimetidin oder Cisaprid. Dennoch sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie **easygastril Kautabletten** gemeinsam mit diesen Präparaten verwenden.

6. Lagerung

Bewahren Sie **easygastril Kautabletten** an einem trockenen Ort und fernab von direkter Hitze oder Lichtquellen auf: Öffnen Sie den Blister nur bei Gebrauch. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 25°C lagern.

7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie **easygastril Kautabletten** bei Kindern und Jugendlichen (6-18 Jahre) nur, wenn es unbedingt notwendig ist und unter ärztlicher Aufsicht. Bei Kindern unter 6 Jahren darf das Produkt nicht angewendet werden.

Obwohl keine Risiken bekannt sind, sollten Schwangere oder Stillende vor Beginn der Anwendung von **easygastril Kautabletten** immer einen Arzt aufsuchen. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird empfohlen, **easygastril Kautabletten** nur auf ärztlichen Rat einzunehmen, obwohl keine Risiken bekannt sind.

Überschreiten Sie die empfohlene Dosierung nicht, da höhere Mengen Verstopfung oder vorübergehenden Durchfall verursachen können. **easygastril Kautabletten** darf bei chronischer Verstopfung oder Durchfall, Nierenerkrankungen oder chronischer Herzinsuffizienz nicht angewendet werden.

Bewirkt **easygastril Kautabletten** auch nach längerer Anwendung keine Linderung der Beschwerden, wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. Verwenden Sie **easygastril Kautabletten** nicht länger als 30 Tage in Folge. Sollten die Beschwerden trotzdem anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Im Falle einer Unverträglichkeit oder bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe sollte **easygastril Kautabletten** nicht angewendet werden.

8. Ablaufdatum

Verwenden Sie **easygastril Kautabletten** nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Ablaufdatum.

Das Ablaufdatum bezieht sich auf das in seiner intakten Verpackung gelagerte Produkt.

9. Entsorgung

Abgelaufene Produkte sind entsprechend den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften zu entsorgen. Werfen Sie das Produkt oder seine Verpackung nicht einfach weg.

Letzte Überarbeitung, Dezember 2018



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIEN

Vertrieb:
Easypharm OTC GmbH
Perlhofgasse 2/2
A-2372 Gießhübl
Österreich

!-

